

Notion de transition épidémiologique

DU MEDIATION EN SANTE

Olivier Bouchaud

Transition épidémiologique

(sanitaire)

→ maladies infectieuses (transmissibles)

=> maladies non transmissibles (5 majeures)

- cardio-vascu,
- respiratoires chroniques,
- métaboliques,
- cancers,
- obésité

– 60% des DC (35 M) ; 50 % morbidité (2/3 en 2020)

Inde: les 3 groupes

Figure 11a: Causes of DALYs, both sexes, all ages, India, 1990






Figure 11b: Causes of DALYs, both sexes, all ages, India, 2010



Transition épidémiologique :

projection des causes de décès

Projected global deaths for selected causes of death, 2002–2030¹⁵



Principales causes

→ Liées les unes aux autres

→ mécanisme clé = urbanisation

- sédentarisation
- modifications alimentaires
 - accès aux sucres rapides et graisses
- toxiques environnementaux
 - pollution
 - agents oncogènes

transition épidémiologique

- reflet au niveau individuel
 - qualitatif : patho infectieuses du « retour » puis patho non transmissibles
 - quantitatif : décroissance de l'état de santé dans le temps
 - d'abord *healthy migrant effect* : 10 à 15 ans
 - puis = idem pop. générale puis < pop générale
 - FdR (diététique++) : ↗ gras, sucre, alcool, tabac, carcinogènes ; ↘ fibres
 - psy. : « adaptation » puis « stress » /conditions socio-économiques